

SA Narva Haigla
Haigla 7, 20104 Narva

РЕГИСТРАТУРА

Пн - Пт: 7:30 - 18:00, +372 35 61 144

Инфотелефон: +372 35 718 35

ЖЕНСКАЯ КЛИНИКА

Секретарь: +372 35 604 09

Руководитель акушерства: + 372 35 715 74

www.narvahaigla.ee

kantselei@narvahaigla.ee



АБРАЗИЯ
И ПРОБНАЯ АБРАЗИЯ
ПОЛОСТИ МАТКИ



Инфолист пациента

Составлено: Tartu Ülikooli Kliinikum

Переведено: Algu OÜ

www.narvahaigla.ee

Абразия полости матки (также чистка полости матки, lat. abrasio) – процедура, в ходе которой выстилающую полость матки слизистую оболочку удаляют при помощи специального инструмента петлевидной формы (кюретки).

Слизистая оболочка матки обычно восстанавливается во время следующего менструального цикла.

ПОКАЗАНИЯ

Основным показанием к проведению абразии является **маточное кровотечение**, которое может быть обусловлено:

- нарушениями менструального цикла;
- осложнениями беременности: самопроизвольное прерывание беременности, задержка развития плода и смерть на ранних сроках беременности (т. н. замершая беременность).

При замершей беременности абразия проводится даже в тех случаях, когда кровотечения нет, поскольку, как

ДОМАШНИЙ УХОД

В течение 24 часов после наркоза нельзя управлять автомобилем или совершать другие действия, требующие быстрой реакции. Лекарства, используемые для наркоза, могут замедлять скорость реакции.

После выскабливания полости матки в течение 2 недель могут возникать вагинальные кровотечения.

Днем в случае сильного кровотечения, повышения температуры или болей в нижней части живота необходимо обратиться к врачу женской консультации, а в другое время – в больницу.

В течение 2 недель после выскабливания полости матки не рекомендуется вести половую жизнь.

Менструация должна начаться через 4–5 недель после проведения процедуры. Если к этому времени менструация не началась, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.

Если это прерывание беременности, Вы имеете право на получение противозачаточных таблеток со скидкой 75% в течение 3 месяцев.

правило, спонтанное кровотечение рано или поздно все равно возникает.

Одним из подвидов абразии является **пробная абразия** (соскоб слизистой матки для уточнения диагноза).

Пробная абразия показана при:

- маточных кровотечениях по неясным причинам;
- патологии слизистой оболочки матки (например, полип), обнаруженной при ультразвуковом исследовании, или при подозрении на нее;
- атипичном результате при онкоцитологическом исследовании шейки матки.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ДОМА

Во избежание осложнений во время наркоза, за 6 часов до операции следует прекратить прием твердой пищи.

В день операции нельзя принимать пищу, пить жидкости, курить и жевать жвачку.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

Абразию полости матки проводят через влагалище **под кратковременным наркозом**.

Сначала проводится гинекологический осмотр для определения размеров и положения матки.

Затем при необходимости расширяют канал шейки матки и удаляют из полости матки слизистую оболочку или оставшиеся после беременности части плода. При необходимости соскоб отправляют на исследование.

Вся процедура занимает от 5 до 15 минут.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

После абразии Вы будете находиться под наблюдением **в течение нескольких часов**. После того как вы полностью восстановитесь от наркоза, Вы сможете покинуть стационар, предварительно предупредив об этом персонал.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОПАСНОСТИ

В ходе процедуры могут возникнуть осложнения.

Возможные осложнения:

- аллергические реакции на лекарства
- кровотечение
- повреждение матки инструментом (очень редко повреждаются также соседние органы)

В случае осложнений может возникнуть необходимость в оперативном лечении. В худшем случае вследствие осложнений может потребоваться удаление матки. После абразии может возникнуть воспаление внутренних органов (оно лечится с помощью антибиотиков)